欢迎加入高中数学竞赛及高考群：766755640

2010 北京大学 香港大学 北京航空航天大学 自主招生（三校联招）

试题 数学部分

1. (仅文科做) $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 求证: $\sin \alpha < \alpha < \tan \alpha$.
2. AB 为边长为1的正五边形边上的点. 证明: AB 最长为 $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$. (25分)
3. AB 为 $y=1-x^2$ 上在 y 轴两侧的点, 求过 AB 的切线与 x 轴围成面积的最小值. (25分)
4. 向量 OA 与 OB 已知夹角, $|OA|=1$, $|OB|=2$, $OP=(1-t)OA$, $OQ=tOB$, $0 \leq t \leq 1$. $|PQ|$ 在 t_0 时取得最小值, 问当 $0 < t_0 < \frac{1}{5}$ 时, 夹角的取值范围. (25分)
5. (仅理科做) 存不存在 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 使得 $\sin x, \cos x, \tan x, \cot x$ 为等差数列. (25分)

2010 北京大学 香港大学 北京航空航天大学 自主招生（三校联招）

试题 数学部分解析

1. (仅文科做) $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 求证: $\sin \alpha < \alpha < \tan \alpha$.

【解析】不妨设 $f(x) = x - \sin x$, 则 $f(0) = 0$, 且当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $f'(x) = 1 - \cos x > 0$. 于是 $f(x)$ 在 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 上单调增. $\therefore f(x) > f(0) = 0$. 即有 $x > \sin x$.

同理可证 $g(x) = \tan x - x > 0$.

$g(0) = 0$, 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $g'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - 1 > 0$. 于是 $g(x)$ 在 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 上单调增.

$\therefore$ 在 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 上有 $g(x) > g(0) = 0$. 即 $\tan x > x$.

注记: 也可用三角函数线的方法求解.

2. AB 为边长为1的正五边形边上的点. 证明: AB 最长为 $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$. (25分)

【解析】以正五边形一条边上的中点为原点, 此边所在的直线为 x 轴, 建立如图所示的平面直角坐标系.

(1) 当 A, B 中有一点位于 P 点时, 知另一点位于 R_1 或者 R_2 时有最大值为 $|PR_1|$; 当有一点位于 O 点时, $|AB|_{\max} = |OP| < |PR_1|$;

(2) 当 A, B 均不在 y 轴上时, 知 A, B 必在 y 轴的异侧方可能

取到最大值 (否则取 A 点关于 y 轴的对称点 A' , 有 $|AB| < |A'B|$).

不妨设 A 位于线段 OR_2 上 (由正五边形的中心对称性, 知这样的假设是合理的), 则使 $|AB|$ 最大的 B 点必位于线段 PQ 上.

且当 B 从 P 向 Q 移动时, $|AB|$ 先减小后增大, 于是

$$|AB|_{\max} = |AP| \text{ 或 } |AQ|;$$

对于线段 PQ 上任意一点 B , 都有 $|BR_2| \geq |BA|$. 于是 $|AB|_{\max} = |R_2P| = |R_2Q|$

由(1), (2)知 $|AB|_{\max} = |R_2P|$. 不妨设为 x .

下面研究正五边形对角线的长.

如右图，做 $\angle EFG$ 的角平分线 FH 交 EG 于 H 。

易知 $\angle EFH = \angle HFG = \angle GFI = \angle IGF = \angle FGH = \frac{\pi}{5}$ 。

于是四边形 $HGIF$ 为平行四边形。 $\therefore |HG| = 1$ 。

由角平分线定理知 $\frac{|EF|}{|FG|} = \frac{x}{1-x} = \frac{|EH|}{|HG|}$ 。解得 $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 。

3. AB 为 $y=1-x^2$ 上在 y 轴两侧的点，求过 AB 的切线与 x 轴围成面积的最小值。(25分)

【解析】不妨设过 A 点的切线交 x 轴于点 C ，过 B 点的切线交 x 轴于点 D ，直线 AC 与直线 BD 相交于点 E 。如图。设

$$B(x_1, y_1), A(x_2, y_2),$$

且有 $y_2 = 1 - x_2^2, y_1 = 1 - x_1^2, x_1 > 0 > x_2$ 。

由于 $y' = -2x$ ，

于是 AC 的方程为 $2x_2x = 2 - y_2 - y$ ；①

BD 的方程为 $2x_1x = 2 - y_1 - y$ 。②

联立 AC, BD 的方程，解得 $E(\frac{y_1 - y_2}{2(x_2 - x_1)}, 1 - x_1x_2)$ 。

对于①，令 $y = 0$ ，得 $C(\frac{2 - y_2}{2x_2}, 0)$ ；

对于②，令 $y = 0$ ，得 $D(\frac{2 - y_1}{2x_1}, 0)$ 。

于是 $|CD| = \frac{2 - y_1}{2x_1} - \frac{2 - y_2}{2x_2} = \frac{1 + x_1^2}{2x_1} - \frac{1 + x_2^2}{2x_2}$ 。

$S_{\triangle ECD} = \frac{1}{2}|CD|(1 - x_1x_2)$ 。不妨设 $x_1 = a > 0, -x_2 = b > 0$ ，则

$$S_{\triangle ECD} = \frac{1}{4}(\frac{1+a^2}{a} + \frac{1+b^2}{b})(1+ab) = \frac{1}{4}(2a+2b + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + a^2b + ab^2)$$

$$= \frac{1}{4}(a+b)(2+ab + \frac{1}{ab}) \geq \frac{1}{4} \cdot 2\sqrt{ab} \cdot (2+ab + \frac{1}{ab}) \quad \text{③}$$

不妨设 $\sqrt{ab} = s > 0$ ，则有

$$S_{\triangle ECD} = \frac{1}{2}(s^3 + 2s + \frac{1}{s}) = \frac{1}{2}(s^3 + \underbrace{\frac{1}{s} + \dots + \frac{1}{s}}_{6 \text{ 个}} + \underbrace{\frac{1}{9s} + \dots + \frac{1}{9s}}_{9 \text{ 个}})$$

6 个 9 个

$$\geq \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot [s^3 \cdot (\frac{1}{3}s)^6 \cdot (\frac{1}{9s})^9]^{1/6} = 8 \cdot (\frac{1}{3})^{24/6} = 8 \cdot (\frac{1}{3})^2 = \frac{8}{9}\sqrt{3} \quad \text{④}$$

又由当 $x_1 = a = \frac{\sqrt{3}}{3}, x_2 = -b = -\frac{\sqrt{3}}{3}, s = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，③，④处的等号均可取到。

欢迎加入高中数学竞赛及高考群：766755640

$$\therefore (S_{\triangle ECD})_{\min} = \frac{8}{9}\sqrt{3}.$$

注记：不妨设 $g(s) = \frac{1}{2}(s^3 + 2s + \frac{1}{s})$ ，事实上，其最小值也可用导函数的方法求解。

由 $g'(s) = \frac{1}{2}(3s^2 + 2 - \frac{1}{s^2})$ 知当 $0 < s^2 < \frac{1}{3}$ 时 $g'(s) < 0$ ；当 $\frac{1}{3} < s^2$ 时 $g'(s) > 0$ 。

则 $g(s)$ 在 $(0, \frac{\sqrt{3}}{3})$ 上单调减，在 $(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty)$ 上单调增。于是当 $s = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时 $g(s)$ 取得最小值。

4. 向量 OA 与 OB 已知夹角， $|OA|=1$ ， $|OB|=2$ ， $OP=(1-t)OA$ ， $OQ=tOB$ ，

$0 \leq t \leq 1$ 。 $|PQ|$ 在 t_0 时取得最小值，问当 $0 < t_0 < \frac{1}{5}$ 时，夹角的取值范围。（25分）

【解析】不妨设 OA ， OB 夹角为 α ，则 $|OP|=1-t$ ， $|OQ|=2t$ ，令

$$g(t) = |PQ|^2 = (1-t)^2 + 4t^2 - 2 \cdot (1-t) \cdot 2t \cos \alpha = (5+4\cos \alpha)t^2 + (-2-4\cos \alpha)t + 1.$$

其对称轴为 $t = \frac{1+2\cos \alpha}{5+4\cos \alpha}$ 。而 $f(x) = \frac{1+2x}{5+4x}$ 在 $(-\frac{5}{4}, +\infty)$ 上单调增，故

$$-1 \leq \frac{1+2\cos \alpha}{5+4\cos \alpha} \leq \frac{1}{3}.$$

当 $0 \leq \frac{1+2\cos \alpha}{5+4\cos \alpha} \leq \frac{1}{3}$ 时， $t_0 = \frac{1+2\cos \alpha}{5+4\cos \alpha} \in (0, \frac{1}{5})$ ，解得 $\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{2\pi}{3}$ 。

当 $-1 \leq \frac{1+2\cos \alpha}{5+4\cos \alpha} < 0$ 时， $g(t)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增，于是 $t_0 = 0$ 。不合题意。

于是夹角的范围为 $[\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}]$ 。

5. 存不存在 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ ，使得 $\sin x$ ， $\cos x$ ， $\tan x$ ， $\cot x$ 为等差数列。（25分）

【解析】不存在；否则有 $\cos x - \sin x = \cot x - \tan x = \frac{(\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x)}{\sin x \cos x}$ ，

则 $\cos x - \sin x = 0$ 或者 $1 = \frac{\cos x + \sin x}{\sin x \cos x}$ 。

若 $\cos x - \sin x = 0$ ，有 $x = \frac{\pi}{4}$ 。而此时 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ， $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ， 1 ， 1 不成等差数列；

若 $1 = \frac{\cos x + \sin x}{\sin x \cos x}$ ，有 $(\sin x \cos x)^2 = 1 + 2\sin x \cos x$ 。解得有 $\sin x \cos x = 1 \pm \sqrt{2}$ 。

而 $\sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x \in (0, \frac{1}{2}]$ ，矛盾！

2011 年综合性大学（北约 13 校）自主选拔录取联合考试

数学试题

请注意：文科考生做 1 至 5 题，理科考生做 3 至 7 题。每题 20 分，共 100 分。

欢迎加入高中数学竞赛及高考群：766755640

1. 已知平行四边形两边长分别是 3 和 5，一条对角线是 6. 求另一条对角线的长度。✚
2. 求过抛物线 $y = 2x^2 - 2x - 1$, $y = -5x^2 + 2x + 3$ 两交点的直线方程。✚
3. 等差数列 $a_1, a_2, \dots$ 满足 $a_3 = -13, a_7 = 3$. 这个数列的前 n 项和为 S_n . 数列 $S_1, S_2, \dots$ 中哪一项最小? 并求出这个最小值。✚
4. 在 $\triangle ABC$ 中, 如果 $a + b \geq 2c$, 证明 $\angle C \leq 60^\circ$ 。✚
5. 是否存在四个正实数, 它们两两乘积分别是 2, 3, 5, 6, 10, 16。✚
6. 设 C_1 和 C_2 是平面上两个不重合的固定圆周。设 C 是该平面上的一个动圆, 它与 C_1 和 C_2 均相切。问: C 的圆心轨迹是何种曲线? 证明你的结论。✚
7. 求 $|x-1| + |2x-1| + \dots + |2011x-1|$ 的最小值。✚

【试题解答】

1. 已知平行四边形的其中两条边长为 3 和 5，一条对角线长为 6，求另一条对角线长。

解析：平行四边形的对角线的平方和等于它四边的平方和，设另一条对角线长为 x ，所以 $x^2 + 6^2 = 2(3^2 + 5^2)$ ，所以 $x = 4\sqrt{2}$ 。

2. 求过抛物线 $y = 2x^2 - 2x - 1$ 和 $y = -5x^2 + 2x + 3$ 的交点的直线方程。

解析：

解法一：由 $\begin{cases} y = 2x^2 - 2x - 1 \cdots (1) \\ y = -5x^2 + 2x + 3 \cdots (2) \end{cases}$ ， $(1) \times 5 + (2)$ 得 $6x + 7y - 1 = 0$ ，所以过抛物线

$y = 2x^2 - 2x - 1$ 和 $y = -5x^2 + 2x + 3$ 的交点的直线方程 $6x + 7y - 1 = 0$ 。

解法二：由 $\begin{cases} y = 2x^2 - 2x - 1 \cdots (1) \\ y = -5x^2 + 2x + 3 \cdots (2) \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x = \frac{2+4\sqrt{2}}{7} \\ y = \frac{-5-24\sqrt{2}}{49} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = \frac{2-4\sqrt{2}}{7} \\ y = \frac{-5+24\sqrt{2}}{49} \end{cases}$ ，所以过

抛物线 $y = 2x^2 - 2x - 1$ 和 $y = -5x^2 + 2x + 3$ 的交点的直线方程 $6x + 7y - 1 = 0$ 。

3. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_3 = -13, a_7 = 3$ ，数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，求数列 $\{S_n\}$ 的最小项，并指出其值为何？

解析：因为 $a_3 = -13, a_7 = 3$ ，所以 $d = 4$ ，所以 $a_n = 4n - 25$ ，

法一：由 $\begin{cases} a_n = 4n - 25 \leq 0 \\ a_{n+1} = 4(n+1) - 25 > 0 \end{cases}$ 得 $\frac{21}{4} < n \leq \frac{25}{4}$ ，又 $n \in \mathbb{N}$ ，所以 $n = 6$ ，所以

$$(S_n)_{\min} = S_6 = \frac{6(a_1 + a_6)}{2} = -66。$$

法二：由 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = 2n^2 - 23n = 2\left(n - \frac{23}{4}\right)^2 - \frac{529}{8}$ ，所以当 $n = 6$ ，

$$(S_n)_{\min} = S_6 = -66。$$

4. 在 $\triangle ABC$ 中， $a + b \geq 2c$ ，求证： $\angle C \leq 60^\circ$ 。

解析：因为 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \geq \frac{a^2 + b^2 - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2}{2ab} = \frac{\frac{3}{4}(a^2 + b^2) - \frac{1}{2}ab}{2ab}$

$$\geq \frac{\frac{3}{4} \cdot 2ab - \frac{1}{2}ab}{2ab} = \frac{1}{2}$$

，当且仅当 $a = b$ 时，“=”成立，又因为 $C \in (0, \pi)$ ，所以 $\angle C \leq 60^\circ$ 。

欢迎加入高中数学竞赛及高考群：766755640

5. 是否存在四个正实数，使得他们的两两乘积为 2, 3, 5, 6, 10, 16?

解析：设存在四个正实数 a, b, c, d 使得他们两两乘积为 2, 3, 5, 6, 10, 16, 因为四个正实数 a, b, c, d 的两两乘积为 ab, ac, ad, bc, bd, cd , 把这些乘积乘起来, 所以 $(abcd)^3 = 2 \times 3 \times 5 \times 6 \times 10 \times 16$, 又 a, b, c, d 为正实数, 所以 $abcd = 4\sqrt[3]{450}$, 所以在 2, 3, 5, 6, 10, 16 中应存在两个数之积等于 $4\sqrt[3]{450}$, 显然这是不可能的, 所以假设不成立, 所以不存在四个正实数, 使得他们的两两乘积为 2, 3, 5, 6, 10, 16。

6. C_1 和 C_2 是平面上两个不重合的固定圆, C 是平面上一个动圆, C 与 C_1, C_2 都相切, 则 C 的圆心的轨迹是何种曲线? 说明理由.

解析：不妨设 C_1, C_2 和 C 的半径分别为 r_1, r_2, r ($r_1 > r_2$),

(1) 当 C_1 和 C_2 相离时, 即 $|C_1C_2| > r_1 + r_2$,

(i) 若 C 与 C_1, C_2 都外切, 则 $|CC_1| = r_1 + r, |CC_2| = r_2 + r$, 所以

$$|CC_1| - |CC_2| = r_1 - r_2;$$

若 C 与 C_1, C_2 都内切, 则 $|CC_1| = r - r_1, |CC_2| = r - r_2$, 所以 $|CC_2| - |CC_1| = r_1 - r_2$;

所以 $||CC_2| - |CC_1|| = r_1 - r_2 < |C_1C_2|$, 由双曲线的定义, C 的圆心的轨迹是以 C_1, C_2 为焦点、实轴长为 $r_1 - r_2$ 的双曲线;

(ii) 若 C 与 C_1 内切, C_2 外切, 则 $|CC_1| = r - r_1, |CC_2| = r_2 + r$, 所以

$$|CC_2| - |CC_1| = r_1 + r_2;$$

若 C 与 C_1 外切, C_2 内切, 则 $|CC_1| = r + r_1, |CC_2| = r - r_2$, 所以 $|CC_1| - |CC_2| = r_1 + r_2$;

欢迎加入高中数学竞赛及高考群：766755640

所以 $||CC_2| - |CC_1|| = r_1 + r_2 < |C_1C_2|$ ，由双曲线的定义， C 的圆心的轨迹是以 C_1, C_2 为焦点、实轴长为 $r_1 + r_2$ 的双曲线；

(2) 当 C_1 和 C_2 外切时，即 $|C_1C_2| = r_1 + r_2$ ，

(i) 若 C 与 C_1, C_2 都外切，则 $|CC_1| = r_1 + r, |CC_2| = r_2 + r$ ，所以

$$|CC_1| - |CC_2| = r_1 - r_2；$$

若 C 与 C_1, C_2 都内切，则 $|CC_1| = r - r_1, |CC_2| = r - r_2$ ，所以 $|CC_2| - |CC_1| = r_1 - r_2$ ；

所以 $||CC_2| - |CC_1|| = r_1 - r_2 < |C_1C_2|$ ，由双曲线的定义， C 的圆心的轨迹是以 C_1, C_2 为焦点、实轴长为 $r_1 - r_2$ 的双曲线；

(ii) 若 C 与 C_1 内切， C_2 外切，则 $|CC_1| = r - r_1, |CC_2| = r_2 + r$ （或 $|CC_1| = r_1 - r, |CC_2| = r_2 + r$ ），所以 $|CC_2| - |CC_1| = r_1 + r_2$ （或 $|CC_2| + |CC_1| = r_1 + r_2$ ）；

若 C 与 C_1 外切， C_2 内切，则 $|CC_1| = r + r_1, |CC_2| = r - r_2$ （或 $|CC_1| = r + r_1, |CC_2| = r_2 - r$ ），所以 $|CC_1| - |CC_2| = r_1 + r_2$ （或 $|CC_2| + |CC_1| = r_1 + r_2$ ）；

所以 $||CC_2| - |CC_1|| = r_1 + r_2 = |C_1C_2|$ 或 $|CC_2| + |CC_1| = r_1 + r_2 = |C_1C_2|$ ，所以 C 的圆心的轨迹是过 C_1, C_2 的直线（除直线与圆 C_1, C_2 的交点外）；

(3) 当 C_1 和 C_2 相交时，即 $r_1 - r_2 < |C_1C_2| < r_1 + r_2$ ，

(i) 若 C 与 C_1, C_2 都外切，则 $|CC_1| = r_1 + r, |CC_2| = r_2 + r$ ，所以

$$|CC_1| - |CC_2| = r_1 - r_2；$$

欢迎加入高中数学竞赛及高考群：766755640

若 C 与 C_1, C_2 都内切, 则 $|CC_1|=r-r_1, |CC_2|=r-r_2$ (或 $|CC_1|=r_1-r, |CC_2|=r_2-r$), 所以 $||CC_2|-|CC_1||=r_1-r_2$;

所以 $||CC_2|-|CC_1||=r_1-r_2 < |C_1C_2|$, 由双曲线的定义, C 的圆心的轨迹是以 C_1, C_2 为焦点、实轴长为 r_1-r_2 的双曲线 (圆 C_1, C_2 的交点除外);

(ii) 若 C 与 C_1 内切, C_2 外切, 则 $|CC_1|=r_1-r, |CC_2|=r_2+r$, 所以 $|CC_2|+|CC_1|=r_1+r_2$;

若 C 与 C_1 外切, C_2 内切, 则 $|CC_1|=r+r_1, |CC_2|=r_2-r$, 所以 $|CC_2|+|CC_1|=r_1+r_2$;

所以 $|CC_2|+|CC_1|=r_1+r_2 > |C_1C_2|$, 由椭圆的定义, C 的圆心的轨迹是以 C_1, C_2 为焦点、实轴长为 r_1+r_2 的椭圆 (圆 C_1, C_2 的交点除外);

(4) 当 C_1 和 C_2 内切时, 即 $|C_1C_2|=r_1-r_2$,

(i) 若 C 与 C_1, C_2 都外切, 则 $|CC_1|=r_1+r, |CC_2|=r_2+r$, 所以 $|CC_1|-|CC_2|=r_1-r_2$;

若 C 与 C_1, C_2 都内切, 则 $|CC_1|=r-r_1, |CC_2|=r-r_2$ (或 $|CC_1|=r_1-r, |CC_2|=r-r_2$ 或 $|CC_1|=r_1-r, |CC_2|=r_2-r$), 所以 $|CC_2|-|CC_1|=r_1-r_2$ (或 $|CC_2|+|CC_1|=r_1-r_2$ 或 $|CC_2|-|CC_1|=r_2-r_1$);

所以 $||CC_2|-|CC_1||=r_1-r_2=|C_1C_2|$ 或 $|CC_2|+|CC_1|=r_1-r_2$, 所以 C 的圆心的轨迹是过 C_1, C_2 的直线 (除直线与圆 C_1, C_2 的交点外);

(ii) 若 C 与 C_1 内切, C_2 外切, 则 $|CC_1|=r_1-r, |CC_2|=r_2+r$, 所以

欢迎加入高中数学竞赛及高考群：766755640

$|CC_2| + |CC_1| = r_1 + r_2 > |C_1C_2|$ ，所以 C 的圆心的轨迹是以 C_1, C_2 为焦点、实轴长为 $r_1 + r_2$ 的椭圆（两圆 C_1, C_2 的交点除外）；

(5) 当 C_1 和 C_2 内含时，即 $|C_1C_2| < r_1 - r_2$ ，

(i) 若 C 与 C_1, C_2 都内切，则 $|CC_1| = r_1 - r, |CC_2| = r - r_2$ ，所以 $|CC_2| + |CC_1| = r_1 - r_2 > |C_1C_2|$ ，所以 C 的圆心的轨迹是以 C_1, C_2 为焦点、实轴长为 $r_1 - r_2$ 的椭圆；

(ii) 若 C 与 C_1 内切， C_2 外切，则 $|CC_1| = r_1 - r, |CC_2| = r_2 + r$ ，所以 $|CC_2| + |CC_1| = r_1 + r_2 > |C_1C_2|$ ，所以 C 的圆心的轨迹是以 C_1, C_2 为焦点、实轴长为 $r_1 + r_2$ 的椭圆。

7. 求 $f(x) = |x-1| + |2x-1| + \dots + |2011x-1|$ 的最小值。

第 7 题解答：由绝对值的几何意义联想到求距离的最小值，如 $|x-a| + |x-b|$ 的最小值应该是在数轴上 a, b 两点之间取得，为 $|a-b|$ 。所以将 $f(x)$ 整理为

$$|x-1| + |x-\frac{1}{2}| + |x-\frac{1}{2}| + |x-\frac{1}{3}| + |x-\frac{1}{3}| + |x-\frac{1}{3}| + \dots + |x-\frac{1}{2011}| + |x-\frac{1}{2011}| + \dots + |x-\frac{1}{2011}|$$

共有 $1+2+3+\dots+2011=1006 \times 2011$ 项，则 $f(x)$ 可以理解为 x 到这 1006×2011 个点的距离之和。从两端开始向中间靠拢，每两个绝对值和的最小值都是在相应的零点之间取得，而且范围是包含关系，比如 $|x-1| + |x-\frac{1}{2011}|$ 的最小值是在 $x \in [\frac{1}{2011}, 1]$ 上取得， $|x-\frac{1}{2}| + |x-\frac{1}{2011}|$ 的最小值是在 $x \in [\frac{1}{2011}, \frac{1}{2}]$ ，所以 $f(x)$ 的最小值应该在正中间的某个零点或相邻两个零点之间取得。由 $\frac{1006 \times 2011}{2} = 503 \times 2011$ 可知取得最小值的范围在第 503×2011 个零点和第 $503 \times 2011 + 1$ 个零点之间（这两个零点也肯相等）
由 $\frac{(1+n)n}{2} < 503 \times 2011$ 算得 $n \leq 1421$ ，所以第 503×2011 个零点和第 $503 \times 2011 + 1$ 个零点均为 $\frac{1}{1422}$ ，则 $f(x)_{\min} = f(\frac{1}{1422}) = \frac{592043}{711}$ 。

解：由零点分区间法讨论去绝对值：

$$\text{当 } x \in (-\infty, \frac{1}{2011}] \text{ 时, } f(x) = (1-x) + (1-2x) + \cdots + (1-2011x),$$

$$\text{斜率 } k_1 = -1-2-\cdots-2011.$$

$$\text{当 } x \in (\frac{1}{2011}, \frac{1}{2010}] \text{ 时,}$$

$$f(x) = (1-x) + (1-2x) + \cdots + (1-2010x) + (2011x-1),$$

$$\text{斜率 } k_2 = -1-2-\cdots-2010+2011.$$

$$\text{当 } x \in (\frac{1}{2010}, \frac{1}{2009}] \text{ 时,}$$

$$f(x) = (1-x) + \cdots + (1-2009x) + (2010x-1) + (2011x-1),$$

$$\text{斜率 } k_3 = -1-2-\cdots-2009+2010+2011.$$

.....

$$\text{当 } x \in (\frac{1}{m+1}, \frac{1}{m}] \text{ 时,}$$

$$f(x) = (1-x) + \cdots + (1-mx) + [(m+1)x-1] + \cdots + (2011x-1)$$

$$\text{斜率 } k_{2012-m} = -1-2-m+(m+1)+\cdots+2011.$$

$$\text{当 } x \in (\frac{1}{m}, \frac{1}{m-1}] \text{ 时,}$$

$$f(x) = (1-x) + \cdots + [1-(m-1)x] + (mx-1) + \cdots + (2011x-1)$$

$$\text{斜率 } k_{2013-m} = -1-2-(m-1)+m+\cdots+2011.$$

$$\begin{cases} k_{2012-m} \leq 0 \\ k_{2013-m} \geq 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} -1-2-m+(m+1)+\cdots+2011 \leq 0 \\ -1-2-(m-1)+m+\cdots+2011 \geq 0 \end{cases},$$

$$\text{即 } \begin{cases} (m-1)m \leq 1006 \times 2011 \\ m(m+1) \geq 1006 \times 2011 \end{cases}, \text{ 由于 } m \in \mathbb{N}^*, \text{ 解得 } m = 1422.$$

$$\text{所以当 } x \in (\frac{1}{1423}, \frac{1}{1422}] \text{ 时,}$$

$$f(x) = (1-x) + \cdots + (1-1422x) + (1423x-1) + \cdots + (2011x-1)$$

$$= 833 - 1422 \times 1423x + 2011 \times 1006x$$

$$f(x)_{\min} = f(\frac{1}{1422}) = \frac{592043}{711}.$$

2012 年北约自主招生数学试题

- 1、求 x 的取值范围使得 $f(x) = |x+2| + |x| + |x-1|$ 是增函数；
- 2、求 $\sqrt{x+11-6\sqrt{x+2}} + \sqrt{x+27-10\sqrt{x+2}} = 1$ 的实数根的个数；
- 3、已知 $(x^2 - 2x + m)(x^2 - 2x + n) = 0$ 的 4 个根组成首项为 $\frac{1}{4}$ 的等差数列，求 $|m-n|$ ；
- 4、如果锐角 $\triangle ABC$ 的外接圆的圆心为 O ，求 O 到三角形三边的距离之比；
- 5、已知点 $A(-2,0), B(2,0)$ ，若点 C 是圆 $x^2 - 2x + y^2 = 0$ 上的动点，求 $\triangle ABC$ 面积的最小值。

6、在 $1, 2, \dots, 2012$ 中取一组数，使得任意两数之和不能被其差整除，最多能取多少个数？

7、求使得 $\sin 4x \sin 2x - \sin x \sin 3x = a$ 在 $[0, \pi)$ 有唯一解的 a ；

8、求证：若圆内接五边形的每个角都相等，则它为正五边形；

9、求证：对于任意的正整数 n ， $(1 + \sqrt{2})^n$ 必可表示成 $\sqrt{s} + \sqrt{s-1}$ 的形式，其中 $s \in N_+$

2012 年自主招生北约联考数学试题解答

1. 求 x 的范围使得 $|x+2| + |x| + |x-1|$ 是增函数.

解答. 分别讨论 x 在 $(-\infty, -2)$, $[-2, 0)$, $[0, 1)$, $[1, \infty)$ 中时, 去掉绝对值. 易知 $x \geq 0$ 即可.

2. 求 $\sqrt{x+11-6\sqrt{x+2}} + \sqrt{x+27-10\sqrt{x+2}} = 1$ 的实根的个数.

解答. 注意到

$$\begin{aligned}\sqrt{x+11-6\sqrt{x+2}} &= \sqrt{(x+2) - 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{x+2} + 3^2} \\ &= \sqrt{(\sqrt{x+2} - 3)^2} \\ &= |3 - \sqrt{x+2}|\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{x+27-10\sqrt{x+2}} &= \sqrt{(x+2) - 2 \cdot 5 \cdot \sqrt{x+2} + 5^2} \\ &= \sqrt{(\sqrt{x+2} + 5)^2} \\ &= |5 + \sqrt{x+2}|\end{aligned}$$

而 $|5 + \sqrt{x+2}| + |3 - \sqrt{x+2}| \geq 2 > 1$, 所以原方程无实数解.

3. 已知 $(x^2 - 2x + m)(x^2 - 2x + n) = 0$ 的 4 个根组成首项为 $\frac{1}{4}$ 的等差数列, 求 $|m - n|$.

解答. 注意到两个方程的一次项系数相同, 所以由韦达定理有首项与末项之和为 2. 因此末项为 $2 - \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$, 这样可算得公差为 $d = \frac{1}{2}$. 于是 4 个根为 $\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{5}{4}, \frac{7}{4}$, 这样

$$|m - n| = \left| \frac{1}{4} \cdot \frac{7}{4} - \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{4} \right| = \frac{1}{2}.$$

4. 如果锐角 $\triangle ABC$ 的外接圆圆心为 O , 求 O 到三角形三边的距离比.

解答. 很容易计算比例为 $\cos A : \cos B : \cos C$, 如果是钝角三角形应该加上绝对值.

5. 已知点 $A(-2, 0), B(0, 2)$, 若点 C 是圆 $x^2 - 2x + y^2 = 0$ 上的动点, 求 $\triangle ABC$ 面积的最小值.

解答. 由数形结合知当 OC 垂直 AB 时(否则利用斜边大于直角边, 两点之间线段最短推矛盾). 因为直线 AB 的方程为 $x - y + 2 = 0$, 所以 O 到 AB 的距离为 $\frac{|1 - 0 + 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$, 于是 $\triangle ABC$ 面积的最小值为 $\frac{1}{2} \cdot \sqrt{2^2 + 2^2} \cdot \left(\frac{3}{\sqrt{2}} - 1\right) = 3 - \sqrt{2}$.

6. 在 $1, 2, \dots, 2012$ 中取一组数, 使得任意两数之和不能被其差整除, 最多能取多少个?

解答. 将 $1, 2, \dots, 2012$ 分成 $(1, 2, 3), (4, 5, 6), \dots, (2008, 2009, 2010), (2011, 2012)$ 这 671 组. 如果取至少 672 个数, 则有抽屉原理必然有 2 个数属于同一组, 不妨设为 $a > b$, 则 $a - b = 1, 2$.

当 $a - b = 1$ 时, 此时 $a - b$ 整除 $a + b$, 不合要求;

当 $a - b = 2$ 时, 此时 a, b 同奇偶, 所以 $a + b$ 为偶数, 从而 $a - b$ 整除 $a + b$, 不合要求.

因此最多取 671 个数, 现在取 $1, 4, 7, \dots, 2011$ 这 671 个数, 此时任两数之和除以 3 的余数为 2, 而两数之差是 3 的倍数, 所以任意两数之和不能被其差整除.

综上所述, 最多能取 671 个数.

7. 求使得 $\sin 4x \sin 2x - \sin x \sin 3x = a$ 在 $[0, \pi)$ 有唯一解的 a .

解答. 设 $f(x) = \sin 4x \sin 2x - \sin x \sin 3x = \frac{1}{2}(\cos 4x - \cos 6x)$ 显然关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称, 因此 $f(x) = a$ 在 $[0, \pi)$ 有唯一解的话, 必然只能在 $x = 0, \frac{\pi}{2}$ 时.

当 $x = 0$ 为解时, 此时 $a = 0$, 方程化为 $\sin x \sin 5x = 0$ 在 $[0, \pi)$ 不止一解, 故舍去.

当 $x = \frac{\pi}{2}$ 为解时, 此时 $a = 1$, 方程化为 $\sin x \sin 5x = 1$. 因为在 $[0, \pi)$ 上 $\sin x \geq 0$, 所以只能是 $\sin x = 1, \sin 5x = 1$, 即 $x = \frac{\pi}{2}$ 为唯一解.

综上所述, $a = 1$.

欢迎加入高中数学竞赛及高考群：766755640

8. 求证：若圆内接五边形的每个角都相等，则它为正五边形。

证明. 设这个五边形为 $ABCDE$ ，令直线 AE, CD 交于点 G ，连结 AC 。因为 $\angle AED = \angle EDC$ ，所以 $\angle GED = \angle GDE$ 。又因为 A, C, D, E 四点共圆，所以

$\angle GAC = \angle EDG = \angle GED$ ，所以 DE 平行于 CD ，

$AE = BC, BC = DE, DE = AB$ ，于是 $AB = BC = CD = DE = DA$ ，即五边形 $ABCDE$ 为正五边形。

注记. 插上图后最后一页出现颜色退化问题，不明原因，图比较简单，索性不插图了。

9. 求证：对任意的正整数 n ， $(1 + \sqrt{2})^n$ 必可表示成 $\sqrt{s} + \sqrt{s-1}$ 的形式，其中 $s \in \mathbb{N}^+$ 。

证明. 构造数列 $a_n = \frac{(1 + \sqrt{2})^n + (1 - \sqrt{2})^n}{2}$ ，则逆用特征根法知

$$a_{n+2} = 2a_{n+1} + a_n, a_1 = 1, a_2 = 3, \forall n \in \mathbb{N}^+,$$

于是 $\{a_n\}$ 为正整数列。另外，注意到

$$\begin{aligned} a_{2n}^2 - 1 &= \left(\frac{(1 + \sqrt{2})^{2n} + (1 - \sqrt{2})^{2n}}{2} \right)^2 - 1 \\ &= \left(\frac{(1 + \sqrt{2})^{2n} - (1 - \sqrt{2})^{2n}}{2} \right)^2, \end{aligned}$$

所以 $\sqrt{a_{2n}^2 - 1} = \frac{(1 + \sqrt{2})^{2n} - (1 - \sqrt{2})^{2n}}{2}$ 。

于是

$$(1 + \sqrt{2})^{2n} = a_{2n} + \sqrt{a_{2n}^2 - 1};$$

同理可证

$$(1 + \sqrt{2})^{2n+1} = a_{2n+1} + \sqrt{a_{2n+1}^2 + 1}$$

综上所述，命题得证。

2013 年北约自主招生数学试题

2013-3-16

(时间 90 分钟，满分 120 分)

一 选择题 (每题 8 分，共 48 分)

1. 以 $\sqrt{2}$ 和 $1-\sqrt[3]{2}$ 为两根的有理系数多项式的次数最小是多少 ()

- A. 2 B. 3 C. 5 D. 6

2. 在 6×6 的棋盘中停放着 3 个红色车和 3 个黑色车，每一行、每一列都只有一个车，共有多少种停放方法 ()

- A. 720 B. 20 C. 518400 D. 14400

3. 已知 $x^2 = 2y + 5$, $y^2 = 2x + 5$, 则 $x^3 - 2x^2y^2 + y^3$ 的值为 () .

- A. -10 B. -12 C. -14 D. -16

4. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，D 为 BC 中点，DM 平分 $\angle ADB$ 交 AB 于点 M，DN 平分 $\angle ADC$ 交 AC 于 N，则 $BM+CN$ 与 MN 的关系为

()

- A. $BM+CN > MN$
 B. $MN+CN < MN$
 C. $BM+CN = MN$
 D. 无法确定

5. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, 前 n 项和为 S_n , $S_{n+1} = 4a_n + 2$, 求 a_{2013} .

- A. 3019×2^{2012} B. 3019×2^{2013} C. 3018×2^{2012} D. 无法确定

6. 模长为 1 的复数 x, y, z 满足 $x + y + z \neq 0$, 求 $\left| \frac{xy + yz + zx}{x + y + z} \right|$.

- A. $-1/2$ B. 1 C. 2 D. 无法确定

二、解答题(每题 18 分,共 72 分)

7. 最多有多少个两两不等的正整数, 满足其中任意三数之和都为素数.
8. 已知 a_i , $i=1,2,3,\dots,2013$ 为 2013 个实数, 满足 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2013} = 0$, 且 $|a_1 - 2a_2| = |a_2 - 2a_3| = \dots = |a_{2013} - 2a_1|$, 求证 $a_1 = a_2 = a_3 = \dots = a_{2013} = 0$.
9. 对于任意的 θ , 求 $32 \cos^6 \theta - \cos 6\theta - 6 \cos 4\theta - 15 \cos 2\theta$ 的值.
10. 已知有 mn 个实数, 排列成 $m \times n$ 阶数阵, 记作 $\{a_{ij}\}_{m \times n}$ 使得数阵的每一行从左到右都是递增的, 即对任意的 $i = 1, 2, 3, \dots, m$, 当 $j_1 < j_2$ 时, 有 $a_{ij_1} < a_{ij_2}$; 现将 $\{a_{ij}\}_{m \times n}$ 的每一列原有的各数按照从上到下递增的顺序排列, 形成一个新的 $m \times n$ 阶数阵, 记作 $\{a'_{ij}\}_{m \times n}$, 即对任意的 $j = 1, 2, 3, \dots, n$, 当 $i_1 < i_2$ 时, 有 $a'_{i_1 j} < a'_{i_2 j}$, 试判断 $\{a'_{ij}\}_{m \times n}$ 中每一行的各数的大小关系, 并加以证明.

2013 年北约自主招生数学试题解析

2013-3-16

(时间 90 分钟，满分 120 分)

一 选择题 (每题 8 分，共 48 分)

1. 以 $\sqrt{2}$ 和 $1-\sqrt[3]{2}$ 为两根的有理系数多项式的次数最小是多少 ()

- A. 2 B. 3 C. 5 D. 6

【解析】 显然 $(x^2-2)((x-1)^3+2)$ 为满足要求的多项式，其次数为 5.

若存在 n 次有理系数多项式 $f(x)$ 以 $\sqrt{2}$ 和 $1-\sqrt[3]{2}$ 为两根，则 $f(x)$ 必含有因式 $(x^2-2)((x-1)^3+2)$ ， $\therefore n \geq 5$ ，即最小次数为 5. 故选 C.

2. 在 6×6 的棋盘中停放着 3 个红色车和 3 个黑色车，每一行、每一列都只有一个车，共有多少种停放方法 ()

- A. 720 B. 20 C. 518400 D. 14400

【解析】 先排 3 个红色车，从 6 行中任取 3 行，有 $C_6^3 = 20$ 种取法；在选定的 3 行中第一行有 6 种停法，第一行选定后第二行有 5 种停法，第二行选定后第三行有 4 种停法；红车放定后，黑车只有 6 种停法. 故停放方法共 $20 \times 6 \times 5 \times 4 \times 6 = 14400$ 种. 故选 D.

3. 已知 $x^2 = 2y + 5$ ， $y^2 = 2x + 5$ ，则 $x^3 - 2x^2y^2 + y^3$ 的值为 () .

- A. -10 B. -12 C. -14 D. -16

【解析】 $\because x^3 - 2x^2y^2 + y^3 = x(2y+5) - 2(2y+5)(2x+5) + y(2x+5)$
 $= -4xy - 15(x+y) - 50,$

又由 $x^2 = 2y + 5$ ， $y^2 = 2x + 5$ ，有 $x^2 - y^2 = -2(x - y)$

$\therefore x = y$ 或 $x + y = -2$.

当 $x = y$ 时，有 $x^2 = 2x + 5$ ， $x = 1 \pm \sqrt{6}$ ，

$$-4xy - 15(x + y) - 50 = -4x^2 - 30x - 50 = -38x - 70 = -38x - 70 = -108 \pm 38\sqrt{6};$$

$$\text{当 } x + y = -2 \text{ 时, } x^2 = -2(x + 2) + 5, \quad x(x + 2) = 1$$

$$-4xy - 15(x + y) - 50 = -4x(-2 - x) - 20$$

$$= 4x(x + 2) - 80 = -16.$$

故选 D.

4. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 为 BC 中点, DM 平分 $\angle ADB$ 交 AB 于点 M , DN 平分 $\angle ADC$ 交 AC 于 N , 则 $BM + CN$ 与 MN 的关系为

()

A. $BM + CN > MN$

B. $MN + CN < MN$

C. $BM + CN = MN$

D. 无法确定

【解析】 延长 ND 至 E , 使 $ND = ED$, 连结 BE 、 ME , 则 $\triangle BED \cong \triangle CND$, $\triangle MED \cong \triangle MND$, $ME = MN$, 由 $BM + BE > EM$, 得 $BM + CN > MN$.

5. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, 前 n 项和为 S_n , $S_{n+1} = 4a_n + 2$, 求 a_{2013} .

A. 3019×2^{2012} B. 3019×2^{2013} C. 3018×2^{2012} D. 无法确定

【解析】 $\because a_1 = 1, a_1 + a_2 = 4a_1 + 2, \therefore a_2 = 5;$

由 $S_{n+1} = 4a_n + 2$, 有 $n \geq 2$ 时, $S_n = 4a_{n-1} + 2$, 于是 $a_{n+1} = 4a_n - 4a_{n-1}$,

特征方程 $x^2 = 4x - 4$ 有重根 2, 可设 $a_n = (c_1 + c_2) \times 2^n$,

将 $a_1 = 1, a_2 = 5$ 代入上式, 得 $c_1 = -\frac{1}{4}, c_2 = \frac{3}{4}$,

于是 $a_n = (\frac{3n}{4} - \frac{1}{4}) \times 2^n = (3n - 1) \times 2^{n-2}, \therefore a_{2013} = 6038 \times 2^{2011} = 3019 \times 2^{2012}$.

故选 A

6. 模长为 1 的复数 x, y, z 满足 $x + y + z \neq 0$, 求 $\left| \frac{xy + yz + zx}{x + y + z} \right|$.

- A. $-1/2$ B. 1 C. 2 D. 无法确定

【解析】 取 $x = y = z = 1$, 便能得到 $\left| \frac{xy + yz + zx}{x + y + z} \right| = 1$.

下面给出证明, $x\bar{x} = y\bar{y} = z\bar{z} = 1$,

$$\begin{aligned} \text{于是 } \left| \frac{xy + yz + zx}{x + y + z} \right|^2 &= \frac{xy + yz + zx}{x + y + z} \overline{\left(\frac{xy + yz + zx}{x + y + z} \right)} = \frac{xy + yz + zx}{x + y + z} \times \frac{\overline{xy + yz + zx}}{\overline{x + y + z}} \\ &= \frac{1 + 1 + 1 + x\bar{z} + y\bar{z} + y\bar{x} + z\bar{x} + z\bar{y} + y\bar{z}}{1 + 1 + 1 + x\bar{z} + y\bar{z} + y\bar{x} + z\bar{x} + z\bar{y} + y\bar{z}} = 1. \quad \therefore \left| \frac{xy + yz + zx}{x + y + z} \right| = 1. \end{aligned}$$

二、解答题(每题 18 分,共 72 分)

7. 最多有多少个两两不等的正整数, 满足其中任意三数之和都为素数.

【解析】 设满足条件的正整数为 n 个. 考虑模 3 的同余类, 共三类, 记为 $\bar{0}$, $\bar{1}$, $\bar{2}$.

则这 n 个正整数需同时满足①不能三类都有; ②同一类中不能有 3 个和超过 3 个. 否则都会出现三数之和为 3 的倍数. 故 $n \leq 4$.

当 $n = 4$ 时, 取 1, 3, 7, 9, 其任意三数之和为 11, 13, 17, 19 均为素数, 满足题意, 所以满足要求的正整数最多有 4 个.

8. 已知 a_i , $i = 1, 2, 3, \dots, 2013$ 为 2013 个实数, 满足 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2013} = 0$, 且

$$|a_1 - 2a_2| = |a_2 - 2a_3| = \dots = |a_{2013} - 2a_1|, \text{ 求证 } a_1 = a_2 = a_3 = \dots = a_{2013} = 0.$$

【解析】 设 $|a_1 - 2a_2| = |a_2 - 2a_3| = \dots = |a_{2013} - 2a_1| = k$,

若 $k = 0$, 则 $a_1 = 2a_2$, $a_2 = 2a_3$, $\dots$, $a_{2012} = 2a_{2013}$, $a_{2013} = 2a_1$,

$$\text{于是 } a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2013} = a_1 + \frac{a_1}{2} + \frac{a_1}{2^2} + \dots + \frac{a_1}{2^{2011}} + 2a_1 = 0,$$

$$\therefore a_1 = 0, \text{ 进而 } a_1 = a_2 = a_3 = \dots = a_{2013} = 0.$$

若 $k > 0$, 则 $|a_1 - 2a_2|, |a_2 - 2a_3|, \dots, |a_{2013} - 2a_1|$ 这 2013 个数去掉绝对值号后

欢迎加入高中数学竞赛及高考群：766755640

只能取 k 和 $-k$ 两值，

$$\text{又 } a_1 - 2a_2 + a_2 - 2a_3 + \cdots + a_{2012} - 2a_{2013} + a_{2013} - 2a_1 = 0,$$

即这 2013 个数去掉绝对值号后取 k 和 $-k$ 两值的个数相同，这不可能。

9. 对于任意的 θ ，求 $32 \cos^6 \theta - \cos 6\theta - 6 \cos 4\theta - 15 \cos 2\theta$ 的值。

【解析】 $32 \cos^6 \theta = 32 \left(\frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right)^3 = 4 \cos^3 2\theta + 12 \cos^2 2\theta + 12 \cos 2\theta + 4,$

$$- \cos 6\theta = -4 \cos^3 2\theta + 3 \cos 2\theta,$$

$$- 6 \cos 4\theta = -12 \cos^2 2\theta + 6,$$

$$- 15 \cos 2\theta = -15 \cos 2\theta,$$

$$\text{各式相加，得 } 32 \cos^6 \theta - \cos 6\theta - 6 \cos 4\theta - 15 \cos 2\theta = 10.$$

10. 已知有 mn 个实数，排列成 $m \times n$ 阶数阵，记作 $\{a_{ij}\}_{m \times n}$ 使得数阵的每一行从左到右都是递增的，即对任意的 $i = 1, 2, 3, \dots, m$ ，当 $j_1 < j_2$ 时，有 $a_{ij_1} < a_{ij_2}$ ；现将 $\{a_{ij}\}_{m \times n}$ 的每一列原有的各数按照从上到下递增的顺序排列，形成一个新的 $m \times n$ 阶数阵，记作 $\{a'_{ij}\}_{m \times n}$ ，即对任意的 $j = 1, 2, 3, \dots, n$ ，当 $i_1 < i_2$ 时，有 $a'_{i_1 j} < a'_{i_2 j}$ ，试判断 $\{a'_{ij}\}_{m \times n}$ 中每一行的各数的大小关系，并加以证明。

【解析】 数阵 $\{a'_{ij}\}_{m \times n}$ 中的每一行的各数仍是递增的。下面用反证法给出证明。

若在第 p 行存在 $a'_{pq} > a'_{p(q+1)}$ ，令 $a'_{k(q+1)} = a'_{i_k(q+1)}$ ，其中 $k = 1, 2, 3, \dots, m$ ，

$$\{i_1, i_2, i_3, \dots, i_m\} = \{1, 2, 3, \dots, m\}, \text{ 则当 } t \leq p \text{ 时, } a'_{i_t q} \leq a'_{i_t(q+1)} = a'_{t(q+1)} \leq a'_{p(q+1)} < a'_{pq}$$

即在第 q 列中至少有 p 个数小于 a'_{pq} ，也就是 a'_{pq} 在数阵 $\{a'_{ij}\}_{m \times n}$ 中的第 q 列中至少排在第 $p+1$ 行，这与 a'_{pq} 排在第 p 行矛盾。所以数阵 $\{a'_{ij}\}_{m \times n}$ 中的每一行的各数仍是递增的。

2014 北约理科数学试题

- 1、圆心角为 $\frac{\pi}{3}$ 的扇形面积为 6π , 求它围成圆锥的表面积.
- 2、将 10 个人分成 3 组, 一组 4 人, 两组各 3 人, 求共有几种分法.
- 3、 $f\left(\frac{a+2b}{3}\right) = \frac{f(a)+2f(b)}{3}$, $f(1)=1, f(4)=7$, 求 $f(2014)$.
- 4、 $f(x) = \lg(x^2 - 2ax + a)$ 的值域为 R , 求 a 的取值范围.
- 5、已知 $x+y=-1$, 且 x, y 都为负实数, 求 $xy + \frac{1}{xy}$ 的取值范围.
- 6、 $f(x) = \arctan \frac{2+2x}{1-4x} + C$ 在 $\left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$ 上为奇函数, 求 C 的值.
- 7、求证: $\tan 3^\circ \notin \mathbb{Q}$.
- 8、已知实系数二次函数 $f(x)$ 与 $g(x)$, $f(x) = g(x)$ 和 $3f(x) + g(x) = 0$ 有两重根, $f(x)$ 有两相异实根, 求证: $g(x)$ 没有实根.
- 9、 $a_1, a_2, \dots, a_{13}$ 是等差数列, $M = \{a_i + a_j + a_k \mid 1 \leq i < j < k \leq 13\}$, 问: $0, \frac{7}{2}, \frac{16}{3}$ 是否可以同时在 M 中, 并证明你的结论.
- 10、 $x_i > 0 (i=1, 2, \dots, n)$, $\prod_{i=1}^n x_i = 1$. 求证: $\prod_{i=1}^n (\sqrt{2} + x_i) \geq (\sqrt{2} + 1)^n$.

2014 北约文科数学试题

- 1、圆心角为 $\frac{\pi}{3}$ 的扇形面积为 6π , 求它围成圆锥的表面积.
- 2、将 10 个人分成 3 组, 一组 4 人, 两组各 3 人, 求共有几种分法.
- 3、 $f\left(\frac{a+2b}{3}\right) = \frac{f(a)+2f(b)}{3}$, $f(1)=1, f(4)=7$, 求 $f(2014)$.
- 4、 $f(x) = \lg(x^2 - 2ax + a)$ 的值域为 R , 求 a 的取值范围.
- 5、已知 $x + y = -1$, 且 x, y 都为负实数, 求 $xy + \frac{1}{xy}$ 的取值范围.
- 6、 $f(x) = \arctan \frac{2+2x}{1-4x} + C$ 在 $\left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$ 上为奇函数, 求 C 的值.
- 7、等比数列 $\{4n+1\} (1 \leq n \leq 200), \{6m-3\} (1 \leq m \leq 200)$ 的公共项之和.
- 8、梯形的对角线长分别为 5 和 7, 高是 3, 求梯形的面积.

- 9、求证: $\tan 3^\circ \notin \mathbb{Q}$.
- 10、已知实系数二次函数 $f(x)$ 与 $g(x)$, $f(x) = g(x)$ 和 $3f(x) + g(x) = 0$ 有两重根, $f(x)$ 有两相异实根, 求证: $g(x)$ 没有实根.

2014 北约理科数学试题（参考答案）

1、圆心角为 $\frac{\pi}{3}$ 的扇形面积为 6π , 求它围成圆锥的表面积.

【解析】 $S_{\text{扇}} = \frac{1}{2}\alpha R^2, \Rightarrow R = 6, l = \alpha R = 2\pi$, 从而圆锥底面周长为

$$2\pi = 2\pi r, \Rightarrow S_{\text{底}} = \pi r^2 = \pi, S = 6\pi + \pi = 7\pi.$$

2、将 10 个人分成 3 组，一组 4 人，两组各 3 人，求共有几种分法.

【解析】 平均分堆问题. $\frac{C_{10}^4 \cdot C_6^3 \cdot C_3^3}{2!} = 2100$.

3、 $f\left(\frac{a+2b}{3}\right) = \frac{f(a)+2f(b)}{3}, f(1)=1, f(4)=7$, 求 $f(2014)$.

【解析】 观察等式可知，函数显然为线性一次函数，可设 $f(x) = kx + m, f(1)=1, f(4)=7$ 代

$$\text{入求得 } k=2, m=-1, \text{ 从而 } f(2014) = 4027.$$

4、 $f(x) = \lg(x^2 - 2ax + a)$ 的值域为 R , 求 a 的取值范围.

【解析】 值域问题. $\Delta = 4a^2 - 4a \geq 0, \Rightarrow a \geq 1$ 或 $a \leq 0$.

5、已知 $x + y = -1$, 且 x, y 都为负实数，求 $xy + \frac{1}{xy}$ 的取值范围.

【解析】 均值不等式，对勾函数性质. $1 = (-x) + (-y) \geq 2\sqrt{xy}, \Rightarrow 0 < xy \leq \frac{1}{4}$, 从而 $xy + \frac{1}{xy} \geq \frac{17}{4}$.

6、 $f(x) = \arctan \frac{2+2x}{1-4x} + C$ 在 $\left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$ 上为奇函数，求 C 的值.

【解析】 $f(0) = 0, \Rightarrow C = -\arctan 2$. 下面证明：

$$f(x) + f(-x) = \arctan \frac{2+2x}{1-4x} + \arctan \frac{2-2x}{1+4x} + 2C = \arctan \left(-\frac{4}{3}\right) - 2\arctan 2 = 0.$$

7、求证： $\tan 3^\circ \notin Q$.

【解析】 反证法. 假设 $\tan 3^\circ \in Q$, 则 $\tan 6^\circ \in Q, \Rightarrow \tan 12^\circ \in Q, \Rightarrow \tan 24^\circ \in Q$, 从而 $\tan 30^\circ \in Q$, 矛

$$\text{盾} \therefore \tan 3^\circ \notin Q.$$

8、已知实系数二次函数 $f(x)$ 与 $g(x), f(x) = g(x)$ 和 $3f(x) + g(x) = 0$ 有两重根， $f(x)$ 有两

欢迎加入高中数学竞赛及高考群：766755640

相异实根，求证： $g(x)$ 没有实根.

【解析】 设 $f(x) = ax^2 + bx + c$, $g(x) = dx^2 + ex + f$,

则由 $f(x) = g(x)$, 可得

$$(a-d)x^2 + (b-e)x + (c-f) = 0, \Delta = (b-e)^2 - 4(a-d)(c-f) = 0.$$

由 $3f(x) + g(x) = 0$ 可得

$$(3a+d)x^2 + (3b+e)x + (3c+f) = 0, \Delta = (3b+e)^2 - 4(3a+d)(3c+f) = 0.$$

化简得 $3b^2 + e^2 = 12ac + 4df$, 即 $e^2 - 4df = 3(4ac - b^2)$ 又 $b^2 - 4ac > 0$.

$\therefore e^2 - 4df < 0. \therefore g(x)$ 没有实根.

9、 $a_1, a_2, \dots, a_{13}$ 是等差数列, $M = \{a_i + a_j + a_k \mid 1 \leq i < j < k \leq 13\}$, 问: $0, \frac{7}{2}, \frac{16}{3}$ 是否可以同时在 M 中, 并证明你的结论.

【解析】 数列中的项. 分析 M 中项的构成, 若按照从小到大的顺序排列, 最小的项为

$a_1 + a_2 + a_3$, 第二项为 $a_1 + a_2 + a_4$, 最大的项为 $a_{11} + a_{12} + a_{13}$, 设 a_n 公差为 d , 则 M 中

项的公差也为 d , 所以 M 中共有 $11 + 12 + 13 - 1 - 2 - 3 + 1 = 31$ 项, 假设 $0, \frac{7}{2}, \frac{16}{3}$ 均为

M 中的项, 不妨设 $\frac{7}{2} - 0 = k_1 d, \frac{16}{3} - \frac{7}{2} = k_2 d, \Rightarrow \frac{k_2}{k_1} = \frac{11}{21}, k_1, k_2 \in \mathbb{Z}, 0 < k_1, k_2 \leq 30$, 且

$k_1 + k_2 \leq 31$, 这样的 k 不存在, 矛盾. 所以 $0, \frac{7}{2}, \frac{16}{3}$ 不可以同时在 M 中.

10、 $x_i > 0 (i=1, 2, \dots, n)$, $\prod_{i=1}^n x_i = 1$. 求证: $\prod_{i=1}^n (\sqrt{2} + x_i) \geq (\sqrt{2} + 1)^n$.

【解析】 不等式; 柯西不等式或 $AM - GM$ 平均不等式.

法一: $AM - GM$ 不等式. 调和平均值 $H_n = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{\sqrt{2} + x_i}\right)} \leq G_n = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n (\sqrt{2} + x_i)}$,

$$\text{则 } \frac{n}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} + x_i}\right)} \leq \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2}} (\sqrt{2} + x_i)}, \quad \frac{n}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i}{\sqrt{2} + x_i}\right)} \leq \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i} (\sqrt{2} + x_i)} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n (\sqrt{2} + x_i)}$$

$$\text{可得 } \frac{\sqrt{2}n}{\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n (\sqrt{2} + x_i)}} \leq \sum_{i=1}^n \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} + x_i}\right), \quad \frac{n}{\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n (\sqrt{2} + x_i)}} \leq \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i}{\sqrt{2} + x_i}\right)$$

上述两式相加得 $\frac{(\sqrt{2}+1)n}{\sqrt[n]{\prod_i (\sqrt{2}+x_i)}} \leq \sum_i \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}+x_i} \right) + \sum_i \left(\frac{x_i}{\sqrt{2}+x_i} \right) = n$,

即 $(\sqrt{2}+1) \leq \sqrt[n]{\prod_i (\sqrt{2}+x_i)}$, 即 $(\sqrt{2}+1)^n \leq \prod_i (\sqrt{2}+x_i)$

法二：由 $\prod_{i=1}^n x_i = 1$. 及要证的结论分析，由柯西不等式得 $(\sqrt{2}+x_i) \left(\sqrt{2} + \frac{1}{x_i} \right) \geq (\sqrt{2}+1)^2$,

从而可设 $y_i = \frac{1}{x_i}$, 且 $\prod_{i=1}^n y_i = \prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i} = 1$. 从而本题也即证 $\prod_{i=1}^n (\sqrt{2}+y_i) \geq (\sqrt{2}+1)^n$.

从而 $\prod_i (\sqrt{2}+x_i) \left(\sqrt{2} + \frac{1}{x_i} \right) \geq (\sqrt{2}+1)^{2n}$, 即 $\prod_i (\sqrt{2}+x_i)(\sqrt{2}+y_i) \geq (\sqrt{2}+1)^{2n}$,

假设原式不成立，即 $\prod_{i=1}^n (\sqrt{2}+x_i) < (\sqrt{2}+1)^n$, 则 $\prod_{i=1}^n (\sqrt{2}+y_i) < (\sqrt{2}+1)^n$.

从而 $\prod_i (\sqrt{2}+x_i)(\sqrt{2}+y_i) < (\sqrt{2}+1)^{2n}$, 矛盾. 得证.

微信公众号：
 学习资源宝库

2014 北约文科数学试题（参考答案）

1、圆心角为 $\frac{\pi}{3}$ 的扇形面积为 6π , 求它围成圆锥的表面积.

【解析】 $S_{\text{扇}} = \frac{1}{2}\alpha R^2, \Rightarrow R = 6, l = \alpha R = 2\pi$, 从而圆锥底面周长为

$$2\pi = 2\pi r, \Rightarrow S_{\text{底}} = \pi r^2 = \pi, S = 6\pi + \pi = 7\pi.$$

2、将 10 个人分成 3 组，一组 4 人，两组各 3 人，求共有几种分法.

【解析】 平均分堆问题. $\frac{C_{10}^4 \cdot C_6^3 \cdot C_3^3}{2!} = 2100$.

3、 $f\left(\frac{a+2b}{3}\right) = \frac{f(a)+2f(b)}{3}, f(1)=1, f(4)=7$, 求 $f(2014)$.

【解析】 观察等式可知，函数显然为线性一次函数，可设 $f(x) = kx + m, f(1)=1, f(4)=7$ 代

$$\text{入求得 } k=2, m=-1, \text{ 从而 } f(2014) = 4027.$$

4、 $f(x) = \lg(x^2 - 2ax + a)$ 的值域为 R , 求 a 的取值范围.

【解析】 值域问题. $\Delta = 4a^2 - 4a \geq 0, \Rightarrow a \geq 1$ 或 $a \leq 0$.

5、已知 $x + y = -1$, 且 x, y 都为负实数，求 $xy + \frac{1}{xy}$ 的取值范围.

【解析】 均值不等式，对勾函数性质. $1 = (-x) + (-y) \geq 2\sqrt{xy}, \Rightarrow 0 < xy \leq \frac{1}{4}$, 从而 $xy + \frac{1}{xy} \geq \frac{17}{4}$.

6、 $f(x) = \arctan \frac{2+2x}{1-4x} + C$ 在 $\left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$ 上为奇函数，求 C 的值.

【解析】 $f(0) = 0, \Rightarrow C = -\arctan 2$. 下面证明：

$$f(x) + f(-x) = \arctan \frac{2+2x}{1-4x} + \arctan \frac{2-2x}{1+4x} + 2C = \arctan \left(-\frac{4}{3}\right) - 2\arctan 2 = 0.$$

7、等比数列 $\{4n+1\} (1 \leq n \leq 200), \{6m-3\} (1 \leq m \leq 200)$ 的公共项之和.

【解析】 此题考察数的同余问题；设公共项为 $a, a \equiv 1 \pmod{4}, a \equiv 3 \pmod{6}$.

易得 a 最小的数为 9. 4 和 6 的最小公倍数为 12, 则

$$a = 9 + 12k, k \in N. 9 + 12k = 4 \times 200 + 1, \Rightarrow k = 66. \therefore \text{公共项之和为}$$

欢迎加入高中数学竞赛及高考群：766755640

$$S = \frac{67(9+801)}{2} = 27135.$$

8、梯形的对角线长分别为5和7，高是3，求梯形的面积.

【解析】 如图，梯形面积为 $S = \frac{1}{2}(AB+CD)h = \frac{1}{2}(DF+EC)h$ ，易求得 $DF = 2\sqrt{10}, EC = 4$,

$$S = \frac{1}{2}(DF+EC)h = \frac{1}{2}(4+2\sqrt{10})3 = 6+3\sqrt{10}.$$

9、求证： $\tan 3^\circ \notin \mathbb{Q}$.

【解析】 反证法. 假设 $\tan 3^\circ \in \mathbb{Q}$, 则 $\tan 6^\circ \in \mathbb{Q}, \Rightarrow \tan 12^\circ \in \mathbb{Q}, \Rightarrow \tan 24^\circ \in \mathbb{Q}$, 从而 $\tan 30^\circ \in \mathbb{Q}$, 矛盾.

$\therefore \tan 3^\circ \notin \mathbb{Q}$.

10、已知实系数二次函数 $f(x)$ 与 $g(x)$, $f(x) = g(x)$ 和 $3f(x) + g(x) = 0$ 有两重根, $f(x)$ 有两相异实根, 求证: $g(x)$ 没有实根.

【解析】 设 $f(x) = ax^2 + bx + c$, $g(x) = dx^2 + ex + f$,

则由 $f(x) = g(x)$, 可得

$$(a-d)x^2 + (b-e)x + (c-f) = 0, \Delta = (b-e)^2 - 4(a-d)(c-f) = 0.$$

由 $3f(x) + g(x) = 0$ 可得

$$(3a+d)x^2 + (3b+e)x + (3c+f) = 0, \Delta = (3b+e)^2 - 4(3a+d)(3c+f) = 0.$$

化简得 $3b^2 + e^2 = 12ac + 4df$, 即 $e^2 - 4df = 3(4ac - b^2)$ 又 $b^2 - 4ac > 0$.

$\therefore e^2 - 4df < 0. \therefore g(x)$ 没有实根.

2011 年北大保送生考试数学试题参考解答

1. 点 P 为双曲线上任一点, PQ 为双曲线在 P 处的切线, F_1, F_2 为双曲线的焦点. 证明: PQ 平分 $\angle F_1PF_2$.

证明. 由于对称性, 不妨设 P 在第一象限, Q 在 x 轴上, F_1, F_2 分别为左右焦点, 双曲线的方程为

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, c = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

于是可令 P 的坐标为 $(a \cosh t, b \sinh t)$, 其中

$$\cosh t = \frac{e^t + e^{-t}}{2}, \sinh t = \frac{e^t - e^{-t}}{2}.$$

则切线 PQ 方程为

$$\frac{x \cosh t}{a} - \frac{y \sinh t}{b} = 1,$$

于是 Q 点的坐标为 $(\frac{a}{\cosh t}, 0)$.

注意到

$$\begin{aligned} \frac{|PF_1|^2}{|PF_2|^2} &= \frac{(a \cosh t + c)^2 + b^2 \sinh^2 t}{(a \cosh t - c)^2 + b^2 \sinh^2 t} \\ &= \frac{(a \cosh t + c)^2 + (c^2 - a^2)(\cosh^2 t - 1)}{(a \cosh t - c)^2 + (c^2 - a^2)(\cosh^2 t - 1)} \\ &= \left(\frac{a \cosh t + c}{a \cosh t - c} \right)^2 = \frac{|QF_1|^2}{|QF_2|^2}, \end{aligned}$$

于是

$$\frac{|PF_1|}{|PF_2|} = \frac{|QF_1|}{|QF_2|},$$

因此 PQ 平分 $\angle F_1PF_2$.

微信

2. 在 $\triangle ABC$ 中存在一点 O , 满足 $\angle BAO = \angle CAO = \angle CBO = \angle ACO$, 求证: $\triangle ABC$ 的三边长组成等比数列.

证明. 显然有

$$\frac{OA}{OB} \frac{OB}{OC} \frac{OC}{OA} = 1,$$

由正弦定理得

$$\frac{\sin \angle ABO \sin \angle OCB \sin \angle OAC}{\sin \angle BAO \sin \angle OBC \sin \angle OCA} = 1,$$

利用已知条件, 可得

$$\sin \frac{2B-A}{2} \sin \frac{2C-A}{2} = \sin^2 \frac{A}{2},$$

变形得

$$\cos(C-B) - \cos(C+B-A) = 1 - \cos A,$$

即

$$\cos(C-B) - \cos(C+B) = 1 - \cos 2A \iff \sin C \sin B = \sin^2 A.$$

3. 是否存在实数 a , 使得 $f(x) = ax + \sin x$ 存在两切线互相垂直.

解答. 令 $a = 0$, 则 $f(x) = \sin x$, 它在 $x = 0$ 处的切线为 $y = x$. 另外它在 $x = \pi$ 处的切线为 $y = -(x - \pi)$. 显然这两条切线互相垂直. ■

注记. 个人认为题目应该是问是否存在非零实数 a 满足条件, 答案是不存在, 这个可以转化为一元二次方程的问题, 大家可以试试手. ■

4. 设 p, q 为实数, $f(x) = x^2 + px + q$, 如果 $f(f(x)) = 0$ 只有一个实根, 求证: $p, q \geq 0$.

证明. 显然 $f(x) = 0$ 有实根, 不妨设之为 α, β (可以相等), 则

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \beta), \quad f(f(x)) = (f(x) - \alpha)(f(x) - \beta). \quad (1)$$

如果 α, β 中一者大于 0, 不妨设为 α , 那么由于 $f(x)$ 开口向上且 $f(x) = 0$ 有实根, 那么 $f(x) - \alpha = 0$ 必然有两不等实根, 由 (1) 知这与 $f(f(x)) = 0$ 只有一个实根矛盾. 因此 α, β 都不大于 0, 从而由韦达定理知

$$p = -(\alpha + \beta) \geq 0, \quad q = \alpha\beta \geq 0.$$

5. 单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 有三点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$. 若

$$x_1 + x_2 + x_3 = y_1 + y_2 + y_3 = 0,$$

求证: $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = \frac{3}{2}$.

证明. 由题意知 $\triangle ABC$ 的重心为原点, 即与外心重合, 所以 $\triangle ABC$ 为正三角形, 所以可以设 A, B, C 对应辐角 $\theta, \theta + \frac{2\pi}{3}, \theta + \frac{4\pi}{3}$, 因此

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 &= \cos^2 \theta + \cos^2 \left(\theta + \frac{2\pi}{3} \right) + \cos^2 \left(\theta + \frac{4\pi}{3} \right) \\ &= \cos^2 \theta + \left(-\frac{1}{2} \cos \theta - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta \right)^2 + \left(-\frac{1}{2} \cos \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta \right)^2 \\ &= \cos^2 \theta + \frac{1}{2} \cos^2 \theta + \frac{3}{2} \sin^2 \theta \\ &= \frac{3}{2}, \end{aligned}$$

易得此时

$$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 3 - (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) = \frac{3}{2}.$$

微信公众号: 数学竞赛

2012年北京大学保送生考试数学试题及参考解答

1. 已知数列 $\{a_n\}$ 为正项等比数列，且 $a_3 + a_4 - a_1 - a_2 = 5$ ，求 $a_5 + a_6$ 的最小值.

解：设数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q (q > 0)$ ，则 $a_1 q^2 + a_1 q^3 - a_1 - a_1 q = 5$ ，

$$\therefore a_1 = \frac{5}{q^2 + q^3 - 1 - q} = \frac{5}{(q+1)(q^2-1)}. \text{ 由 } a_1 > 0 \text{ 知 } q > 1.$$

$$\begin{aligned} \therefore a_5 + a_6 &= a_1 q^4 + a_1 q^5 = a_1 (q^4 + q^5) = \frac{5}{(q+1)(q^2-1)} \cdot q^4 (q+1) = \frac{5q^4}{q^2-1} \\ &= 5 \left(q^2 + 1 + \frac{1}{q^2-1} \right) = 5 \left(q^2 - 1 + \frac{1}{q^2-1} + 2 \right) \geq 20, \end{aligned}$$

当且仅当 $q^2 - 1 = \frac{1}{q^2 - 1}$ 即 $q = \sqrt{2}$ 时， $a_5 + a_6$ 有最小值 20.

2. 已知 $f(x)$ 为二次函数，且 $a, f(a), f(f(a)), f(f(f(a)))$ 成正项等比数列，求证：

$$f(a) = a.$$

证法一：设 $f(x) = mx^2 + nx + t (m \neq 0)$ ，数列 $a, f(a), f(f(a)), f(f(f(a)))$ 的公比为 $q (q > 0)$ ，

$$\text{则 } f(a) = aq, f(f(a)) = f(aq) = aq^2, f(f(f(a))) = f(aq^2) = aq^3,$$

$$\therefore ma^2 + na + t = aq \quad \text{①} \qquad m(aq)^2 + naq + t = aq^2 \quad \text{②}$$

$$m(aq^2)^2 + naq^2 + t = aq^3 \quad \text{③}$$

$$\text{①} - \text{②} \text{ 得 } \therefore ma^2(1 - q^2) + na(1 - q) = aq(1 - q),$$

$$\text{②} - \text{③} \text{ 得 } \therefore ma^2 q^2(1 - q^2) + naq(1 - q) = aq^2(1 - q).$$

若 $q = 1$ ，则 $f(a) = a$ ；

若 $q \neq 1$ ，则 $ma^2(1+q) + na = aq$ 与 $ma^2 q(1+q) + naq = aq^2$ 矛盾.

$\therefore f(a) = a.$

证法二：由 $a, f(a), f(f(a)), f(f(f(a)))$ 成等比数列得

$$\frac{f(a)}{a} = \frac{f(f(a))}{f(a)} = \frac{f(f(f(a)))}{f(f(a))},$$

$$\therefore \frac{f(f(a)) - f(a)}{f(a) - a} = \frac{f(f(f(a))) - f(f(a))}{f(f(a)) - f(a)}.$$

$\therefore$ 三点 $A(a, f(a)), B(f(a), (f(a))), C((f(a)), ((f(a))))$ 满足 $k_{AB} = k_{BC}$,

$\therefore A, B, C$ 三点共线, 与 A, B, C 三点在抛物线上矛盾, $\therefore f(a) = a$.

3. 称四个顶点都落在三角形三边上的正方形叫三角形的内接正方形. 若锐角三角形 ABC 的三边满足 $a > b > c$, 证明: 这个三角形的内接正方形边长的最小值为 $\frac{ac \sin B}{a + c \sin B}$.

解: 如图所示, 设正方形 $MNPQ$ 的边长为 x , $\therefore \frac{AE}{AD} = \frac{MN}{BC}$,

$$\therefore \frac{c \sin B - x}{c \sin B} = \frac{x}{a}, \therefore x = \frac{ac \sin B}{a + c \sin B} = \frac{abc}{2Ra + bc}.$$

同理可得其它两种情况下内接正方形边长为

$$\frac{abc}{2Rb + ac}, \frac{abc}{2Rc + ab}.$$

$$\therefore 2Rb + ac - (2Ra + bc) = (b - a)(2R - c) < 0$$

$$2Rc + ab - (2Ra + bc) = (c - a)(2R - b) < 0,$$

$\therefore$ 这个三角形的内接正方形边长的最小值为 $\frac{ac \sin B}{a + c \sin B}$.

4. 从 O 点发出两条射线 l_1, l_2 , 已知直线 l 交 l_1, l_2 于 A, B 两点, 且 $S_{\triangle OAB} = c$ (c 为定值),

记 AB 中点为 X ,

求证: X 的轨迹为双曲线.

解: 以 l_1, l_2 的角平分线所在直线为 x 轴建立如图所示的直角坐标系.

设 $\angle AOx = \angle BOx = \alpha$, $OA = a, OB = b$, $X(x, y)$,

$$\text{则 } S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} ab \sin 2\alpha = c, \quad ab = \frac{2c}{\sin 2\alpha}.$$

$$\therefore A(a \cos \alpha, a \sin \alpha), B(b \cos \alpha, -b \sin \alpha),$$

$$\therefore \begin{cases} x = \frac{a \cos \alpha + b \cos \alpha}{2}, \\ y = \frac{a \sin \alpha - b \sin \alpha}{2}, \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} \frac{x}{\cos \alpha} = \frac{a+b}{2} \quad (1) \\ \frac{y}{\sin \alpha} = \frac{a-b}{2} \quad (2) \end{cases}$$

$(1)^2 - (2)^2$ 得

$$\frac{x^2}{\cos^2 \alpha} - \frac{y^2}{\sin^2 \alpha} = ab = \frac{2c}{\sin 2\alpha},$$

$\therefore X$ 的轨迹为双曲线.

5. 已知 $a_i (i=1,2,\dots,10)$ 满足 $a_1 + a_2 + \dots + a_{10} = 30, a_1 a_2 \dots a_{10} < 21$, 求证:

$\exists a_i (i=1,2,\dots,10)$, 使 $a_i < 1$.

证明: 用反证法, 假设 $\forall a_i (i=1,2,\dots,10)$, $a_i \geq 1$.

令 $a_i = 1 + b_i (i=1,2,\dots,10)$, 则 $b_i \geq 0$, 且 $b_1 + b_2 + \dots + b_{10} = 20$.

$$\therefore a_1 a_2 \dots a_{10} = (1 + b_1)(1 + b_2) \dots (1 + b_{10})$$

$$= 1 + b_1 + b_2 + \dots + b_{10} + b_1 b_2 + b_2 b_3 + \dots$$

$$= 21 + b_1 b_2 + b_2 b_3 + \dots \geq 21 \text{ 与 } a_1 a_2 \dots a_{10} < 21 \text{ 矛盾,}$$

$\therefore \exists a_i (i=1,2,\dots,10)$, 使 $a_i < 1$.

2013 年北京大学保送生考试数学试题详解

【第 1 题】

$\triangle ABC$ 内点 M 满足 $\angle CMB = 100^\circ$ ，线段 BM 的中垂线交边 AB 于 P ，线段 CM 的中垂线交边 AC 于 Q ，已知： P 、 M 、 Q 三点共线，求 $\angle CAB$ 。

解：如图。

$$\angle PBM + \angle QCM = \angle PMB + \angle QMC = 180^\circ - \angle BMC = 80^\circ$$

$$\angle MBC + \angle MCB = 180^\circ - \angle BMC = 80^\circ$$

于是 $\angle ABC + \angle ACB = (\angle PBM + \angle QCM) + (\angle MBC + \angle MCB) = 160^\circ$, $\angle BAC = 20^\circ$

【第 2 题】

正数 a, b, c 满足 $a < b + c$ ，求证： $\frac{a}{1+a} < \frac{b}{1+b} + \frac{c}{1+c}$ 。

$$\text{解：} \frac{a}{1+a} = \frac{1}{\frac{1}{a}+1} < \frac{1}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b+c}} = \frac{b+c}{b+c+1} = \frac{b}{b+c+1} + \frac{c}{b+c+1} < \frac{b}{1+b} + \frac{c}{1+c}$$

因此原不等式得证。

【第 3 题】

是否存在两两不同的实数 a, b, c ，使直角坐标系中的三条直线 $y = ax + b, y = bx + c, y = cx + a$ 共点。

解：原问题即方程组 $ax + b = bx + c = cx + a$ 有解 (a, b, c, x) ，其中 a, b, c 两两不同。

$$ax + b = bx + c = cx + a \Leftrightarrow x = \frac{c-b}{a-b} = \frac{a-c}{b-c}$$

整理 $\frac{c-b}{a-b} = \frac{a-c}{b-c}$ ，得 $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$ ，与 a, b, c 两两不同矛盾。

于是不存在符合题意的实数对 (a, b, c) 。

欢迎加入高中数学竞赛及高考群：766755640

【第4题】

对 $\{1, 2, \dots, 9\}$ 的某非空子集，若其中所有元素的和为奇数，则称为奇子集，问奇子集的个数。

解：设 $M = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $N = \{2, 4, 6, 8\}$ ，则奇子集由 M 中的 1 个、3 个或 5 个元素以及 N 中的任意个元素组成。因此奇子集共有 $(C_5^1 + C_5^3 + C_5^5) \cdot 2^4 = 256$ 个。

【第5题】

在一个 2013×2013 的正数数表中，每行都成等差数列，每列平方后都成等差，求证：左上角的数和右下角的数之积等于左下角的数和右上角的数之积。

解：下面证明对 $n \times n$ 的数表， $n \geq 3, n \in \mathbf{N}^*, n$ 是奇数，命题均成立。

当 $n = 2k + 1$ 时，不妨设数表如图。

a	...	$\frac{a+b}{2}$	...	b
...	...	...	...	...
$\sqrt{\frac{a^2+c^2}{2}}$	...	$\sqrt{\frac{\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + \left(\frac{c+d}{2}\right)^2}{2}}$	...	$\sqrt{\frac{b^2+d^2}{2}}$
...	...	...	...	...
c	...	$\frac{c+d}{2}$	...	d

$$\text{于是 } 2\sqrt{\frac{\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + \left(\frac{c+d}{2}\right)^2}{2}} = \sqrt{\frac{a^2+c^2}{2}} + \sqrt{\frac{b^2+d^2}{2}}$$

$$\Leftrightarrow (a+b)^2 + (c+d)^2 = a^2 + c^2 + b^2 + d^2 + 2\sqrt{(a^2+c^2)(b^2+d^2)}$$

$$\Leftrightarrow (ab+cd)^2 = (a^2+c^2)(b^2+d^2)$$

$$\Leftrightarrow 2abcd = b^2c^2 + a^2d^2$$

$$\Leftrightarrow ad = bc$$

因此命题成立。